

Cholera

Die Cholera ist vor allem in Entwicklungsländern weit verbreitet. Aber auch beliebte Reiseziele wie Südafrika, Kenia, Indien oder China können von Ausbrüchen betroffen sein. Informationen über aktuelle Cholera-Ausbrüche finden Sie im Internet unter <http://www.who.int/topics/cholera/en/>.

In Europa ist ein Impfstoff in Form einer Suspension verfügbar, die gemeinsam mit einem Brausegranulat in kaltem Wasser aufgelöst und anschließend getrunken wird. Für eine [Grundimmunisierung](#) ab dem 6. Lebensjahr muss die Mischung 2-mal im Abstand von 1-6 Wochen eingenommen werden. Kinder im Alter von 2-6 Jahren erhalten 3 Dosen in diesem Abstand. Nach Abschluss der Behandlung besteht für 1-3 Jahre ein Schutz vor Erkrankung. Die Grundimmunisierung muss eine Woche vor dem Aufenthalt in einem Risikogebiet abgeschlossen sein.

Kinder im Alter zwischen 2 und 6 Jahren benötigen eine Auffrischung nach 6 Monaten. Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren erhalten eine [Auffrischimpfung](#) nach 2 Jahren.

Liegt die erste [Impfung](#) länger als 2 Jahre zurück, wird derzeit die Wiederholung der Grundimmunisierung empfohlen.